

Preparaty do nebulizacji - trwałość

Nazwa handlowa	Substancja lecznicza	Trwałość po otwarciu wg ChPL
<i>Atrovent</i>	bromek ipratropium	brak informacji w ChPL
<i>BDS N</i>	budezonid	foliowa torebka - 3 miesiące
<i>Benodil</i>	budezonid	foliowa torebka - 3 miesiące ampułka - 12 godzin
<i>Berodual</i>	fenoterol bromek ipratropium	brak informacji w ChPL
<i>Budixon Neb</i>	budezonid	foliowa torebka - 3 miesiące
<i>Iprixon Neb</i>	bromek ipratropium salbutamol	foliowa torebka - 7 dni
<i>Mucosolvan</i>	ambroksol	12 miesięcy
<i>Nebbud 0,25 mg/ml</i> <i>Nebbud 0,5 mg/ml</i>	budezonid	foliowa torebka - 3 miesiące ampułka - 12 godzin
<i>Nebbud 0,25 mg/2 ml</i>	budezonid	foliowa torebka - 3 miesiące ampułka - natychmiast po otwarciu
<i>Pulmicort</i>	budezonid	foliowa torebka - 3 miesiące ampułka - 12 godzin
<i>Ventolin</i>	salbutamol	foliowa torebka - 3 miesiące