

Рекомендации по диагностике и клиническому исследованию пациентов при перикардите

Клинические признаки и симптомы

Сухой перикардит	Экссудативный перикардит
<ul style="list-style-type: none"> ■ боль в грудной клетке в области верхушки сердца ■ шум трения перикарда (патогномичный симптом) ■ симптомы воспалительного заболевания (лихорадка, слабость, утомляемость) ■ изменения ЭКГ, аритмии (при вовлечении миокарда) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ одышка (уменьшается в положении сидя с наклоном вперед) ■ сухой кашель ■ набухание яремных вен ■ смещение верхушечного толчка ■ расширение области относительной и абсолютной тупости сердца ■ при перкуссии - притупление под углом левой лопатки (симптом Эварта) ■ после сухого перикардита - уменьшение боли в грудной клетке, изменение условий выслушивания шума трения перикарда ■ симптомы воспалительного заболевания (лихорадка, слабость, утомляемость) ■ нарушения сердечного ритма и проводимости

Диагностика и рекомендуемые клинические исследования

- ЭКГ
 - в отсутствие значительного выпота - четырехфазная картина изменений
 - при значительном объеме выпота - феномен электрической альтернации
- ЭхоКГ (при экссудативном перикардите)
- КТ и МРТ (при осумкованных перикардиальных выпотах)
- рентгенография органов грудной клетки
- лабораторные методы исследования
 - общий, биохимический анализы крови
 - дополнительные анализы для установления причин перикардита

Осложнения перикардита

- тампонада сердца (синдром низкого сердечного выброса, застой в большом круге кровообращения)
- констриктивный перикардит (синдром низкого сердечного выброса)
- хроническая правожелудочковая гиподиастолия

Дифференциальный диагноз

- острый инфаркт миокарда
- кардиомегалия различной этиологии
- плеврит